




	Dosierung	Wirkung
1. bis 3. Tag:	50 mg abends (=1/3 d. Tablette) 	Verbesserung der Schlafqualität
4. bis 6. Tag:	100mg abends (=2/3 d. Tablette) 	Angstlösung
7. bis 14. Tag:	150mg abends (=1 Tablette) 	Depressionslösung
Ab dem 15.Tag:	Dosis beibehalten oder auf 300mg (=2 Tabletten) steigern.  	 Serotonin (5HT ₂)-Antagonist and Reuptake Inhibitor

Bei geriatrischen Patienten genügen meist geringere Dosen (50mg-150mg).

Tagesmaximaldosis ambulant: 400mg, stationär: 600mg



Fachkurzinformation:

Trittico retard 150mg – Tabletten, 20 und 60 Stk.

Zulassungsinhaber: CSC Pharmaceuticals Handels GmbH, 1190 Wien, Tel: 02243/30010/14.

Zusammensetzung: 1 Tablette enthält 150mg Trazodonhydrochlorid.

Anwendungsgebiete: Zur Behandlung von Depressionen unterschiedlicher Ätiologie mit oder ohne Angstkomponente; anhaltenden Schlafstörungen bei Depressionen; im Rahmen von Depressionen auftretende erektile Dysfunktionen ohne schwerwiegende organische Ursachen.

Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegen einen Bestandteil des Präparates; Alkohol- und Schlafmittelvergiftung, frischer Herzinfarkt. Bei Patienten mit Herzerkrankungen, Epilepsie sowie eingeschränkter Nieren- oder Leberfunktion empfehlen sich die üblichen Vorsichtsmaßnahmen. Über die Anwendung bei Kindern und Jugendlichen liegen keine ausreichenden klinischen Erfahrungen vor. Hilfsstoffe: Saccharose 84 mg, Polyvinylpyrrolidon, Carnaubawachs, Magnesiumstearat.

Rezept- und apothekenpflichtig.

Weitere Angaben zu Nebenwirkungen, Wechselwirkungen, Gewöhnungseffekten und zu den besonderen Warnhinweisen zur sicheren Anwendung sind der veröffentlichten Fachinformation zu entnehmen.

Gewerbestrasse 18-20, 2102 Bisamberg

Tel.: 02262/606-0, Fax.: 02262/606-200

e-mail: claudia.aigner-antreich@csc-pharma.com

